

Vir: <https://maribor24.si/lokalno/sentilj/jeseni-je-raznolikost-gob-najvecja/>

ŠENTILJ

Jeseni je raznolikost gob največja

Damjan Veršič, Včeraj (17. 9. 2025) ob 03:30 | Čas branja: 2 min

Na skupnem gobarjenju v Šentilju so našli kar 210 različnih vrst gob.



V organizaciji **Turističnega društva Šentilj**, ki ga prizadevno vodi **Sabina Bezjak**, je pretekli petek potekalo skupno gobarjenje, na katerem je sodeloval tudi strokovnjak za gobe **Slavko Šerod**, ki je med drugim predsednik **Gobarskega društva Lisička Maribor**. V tamkajšnji gozd, imenovan Bold, so se pod njegovim vodstvom podali tudi učenci dveh četrtih razredov šentiljske osnovne šole, po končanem gobarjenju pa so si sodelujoči privoščili odlično **gobovo juho** pri Zoky's pubu, ki so jo skuhale članice turističnega društva. Popoldne so v Kulturno prosvetnem domu Vlada Pipana v Šentilju odprli **lovsko-gobarsko razstavo**, ki si jo je v petek in soboto ogledalo več kot sto ljudi.

210 različnih vrst gob

Šerod nam pove, da je gobarjenje uspelo, saj so našli **210 različnih vrst gob**, ki so jih kasneje razstavili. V lanskem letu so nabrali 313 različnih vrst. Na razstavi so bili prisotni strokovnjaki, ki so obiskovalce vodili skozi razstavo, jim odgovarjali na vprašanja in pokazali različne vrste gob iz okolice in širše. *"Imeli smo tudi mikroskop, s katerim smo zainteresiranim pokazali, kako izgledajo mikroskopski deli gob. Na ta način so si jih lahko tudi sami pobliže ogledali,"* pravi Šerod.



Strokovnjak razloži, da je bilo največ **gob z lističi - listaric**, precej pa tudi **gobanom podobnih gob s cevkami**. *"Od mušnic do golobic, našli smo tudi nekaj dežnikov. Večina gob je bila užitnih. Ljudje se seveda najbolj zanimajo prav za te: kako izgledajo, katere so njihove značilnosti. Prav to je dodana vrednost razstave - da obiskovalce nekdo vodi in opozori na podrobnosti, kako razlikovati užitne gobe od podobnih strupenih."*



Gobarska sezona se šele začne

Gobarski navdušenci bodo veseli novice, da se v tem času sezona gob **pravzaprav šele začne**. Jeseni je namreč največja raznolikost gob. Zato večina društev prireja razstave septembra in oktobra.

*"V društvih ne gledamo le na jurčke in lisičke, ampak na vse gobe, ki jih popisujemo in podatke pošiljamo Gozdarskemu inštitutu Slovenije, v podatkovno bazo **Boletus informaticus**. To delamo ob vsaki aktivnosti, tudi na tako imenovanih **determinacijskih večerih**, ki jih imamo v prostorih društva na Preradovičevi 1 v Mariboru vsak ponedeljek do sredine novembra. Ti večeri so odprti za vse: ljudje prinesejo gobe, mi pa jim povemo, katere so užitne in katere ne," še pojasni sogovornik.*



In katere gobe najpogosteje rastejo jeseni? "Zagotovo so to gobani, polstenke, golobice, kolobarnice, ki začnejo rasti pozneje jeseni, tudi lisičke, dežniki ... V naslednjih tednih, ko bodo temperature nekoliko padle, pričakujemo **še večjo pestrost**. V septembru, oktobru in novembru na razstavah pogosto prikažemo več kot 300 vrst gob. Lisičke, tako kot jurčki, rastejo v valovih. Na Pohorju sta bila letos že dva vala, zdaj pa jih bo verjetno več v nižinah, kjer se ohlaja. Zadnje dni je bilo še prevroče, 30 stopinj, kar gobam ne ustreza. Ko pa bo ob koncu septembra temperatura padla, **bo tudi v nižinah več gob.**"

